



# TENTATIVA AUTOLÍTICA POR FÁRMACOS. RASGOS DIFERENCIALES.

**Oriol Pallás<sup>1</sup>, Carlos Clemente<sup>1</sup>, Mónica Marín-Casino<sup>2</sup>, Xavier Calpe<sup>1</sup>, Isabel Cirera<sup>1</sup>,  
August Supervía<sup>1</sup>.**

Servicio de Urgencias<sup>1</sup> y Servicio de Farmacia<sup>2</sup>. Hospital Universitario del Mar. Barcelona.



## Introducción

- Los fármacos representan la segunda causa de intoxicaciones atendidas en los servicios de urgencias hospitalarios (SU).
- Si bien entre las causas de suicidio los fármacos ocupan el tercer lugar, las tentativas autolíticas por sobreingesta medicamentosa son frecuentes.

## Objetivo

- Determinar las diferencias existentes entre las intoxicaciones medicamentosas con intención autolítica y el resto de intoxicaciones atendidas en el SU.


## Material y Métodos

- Estudio retrospectivo de las intoxicaciones medicamentosas visitadas en el SU.
- Periodo: Enero 2009 – Junio 2014
- Dos grupos:
  - **intención autolítica** o
  - **intoxicación accidental**
- Recogida de datos:

Edad	Tipo de la intoxicación
Sexo	Tóxico implicado
Procedencia	Síntomas y tratamiento
Lugar de la intoxicación	Destino final
	Interconsulta a Psiquiatría
	Tramitación de Comunicado judicial


## Resultados -1

### Núm. intoxicaciones 2009-2014




	Total	Fármacos	T. suicidio
■ Casos	3047	1074	449

### Comparativa



\* =  $p < 0.05$  ;  
\*\* =  $p < 0.01$  ;  
\*\*\* =  $p < 0.001$

## Resultados -2




\* = p < 0.05 ;  
\*\* = p < 0.01 ;  
\*\*\* = p < 0.001

Más de 1 fármaco	%	P
T. autolisis	28.4	< 0.001
Accidental	13.5	


Tratamiento	Carbón activo	P
T. autolisis	46.4 %	< 0.001
Accidental	8.6 %	

## Resultados -3

### Destino



### Interconsultas



\* =  $p < 0.05$  ;  
\*\* =  $p < 0.01$  ;  
\*\*\* =  $p < 0.001$

## Conclusiones

- La intención autolítica representa casi la mitad de las intoxicaciones por fármacos.
- Los fármacos más frecuentemente implicados son las benzodiacepinas.
- En el grupo con tentativa suicida es más frecuente el uso de más de un fármaco.
- En más del 40% de los casos se evidencia consumo de alcohol.
- El carbón activado se administró con más frecuencia que en el resto de las intoxicaciones.
- Precisaron ingreso en Psiquiatría y UCI con mayor frecuencia.
- La implementación de comunicado judicial es muy baja.